

Ostruzione **PARZIALE** delle vie aeree **BAMBINO COSCIENTE**

1

Il bambino è in grado di respirare, parlare, tossire con forza e piangere.



2

NON ESEGUIRE MANOVRE.
Tranquillizzalo dicendogli che lo stai aiutando e incoraggialo a tossire.



Ostruzione **TOTALE** delle vie aeree **BAMBINO COSCIENTE**

Esegui la manovra di Heimlich applicabile su bambini oltre i 12 mesi di età fino alla pubertà.

3

Collocati in piedi o inginocchiato dietro il bambino, circondali i fianchi con entrambe le braccia. Con il pugno chiuso e l'altra mano che lo afferra sopra, effettua delle decise compressioni verso di te e verso l'alto nell'addome del bambino.



4

Con questa manovra si esercita sotto il diaframma una pressione che spinge verso l'alto l'aria residua e determina un potente "colpo di tosse artificiale" che potrebbe rimuovere il corpo estraneo.



Ostruzione **TOTALE** delle vie aeree **BAMBINO INCOSCIENTE**

5



6



7



8



(5) Adagia il bambino al suolo in posizione supina, chiedi aiuto a voce alta. Se qualcuno risponde alla richiesta di aiuto, invialo ad allertare il 118. (6) Procedi con le manovre di rianimazione cardio-polmonare, iniziando dalle compressioni toraciche (profonde circa 4-5 cm). (7) Dopo le 30 compressioni toraciche effettua le 2 ventilazioni, controllando nella bocca e, solo se il corpo estraneo è ben visibile, rimuovilo. (8) Dopo 2 minuti di RCP se qualcuno non lo ha già fatto allerta personalmente il 118. Riprendi la rianimazione cardio polmonare (RCP) fino all'arrivo del soccorso medico d'emergenza 118 (punti 6 e 7).

Se vuoi imparare le manovre di disostruzione o diventare nostro Istruttore contattaci:

salvamentobrescia.it

Ostruzione **TOTALE** delle vie aeree **LATTANTE COSCIENTE**

Se l'ostruzione è parziale, il lattante è in grado di respirare, di tossire con forza e piangere, **NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA**

1



Il lattante non riesce più a piangere, tossisce debolmente e la respirazione diventa difficoltosa. Prendilo in braccio e stringi con una mano la parte ossea della mandibola.

2



Siediti e poni il lattante a faccia in giù sul tuo avambraccio sostenendogli bene il capo, appoggiato sulla tua coscia.

3



Con il palmo della mano libera esegui 5 colpi sulla schiena tra le scapole (colpi interscapolari con via di fuga laterale per non colpire il capo).

4



Ruota il piccolo sul dorso facendo attenzione a sostenere sempre il capo.

5



Esegui 5 compressioni sul torace con 2 dita profonde circa 4 cm.

6



Ripeti la sequenza di 5 colpi sulla schiena e 5 compressioni del torace finché il corpo estraneo non esce o il piccolo riprende a respirare o piangere o finché non perde conoscenza.

© Salvamento Academy - tutti i diritti riservati

Ostruzione **TOTALE** delle vie aeree **LATTANTE INCOSCIENTE**

7



8



9



10



(7) Adagia il piccolo in posizione supina su una superficie rigida, possibilmente sollevata da terra, per esempio un tavolo e chiedi aiuto a voce alta. Se qualcuno risponde alla richiesta di aiuto, invialo ad allertare il 118. (8) Procedi con le manovre di rianimazione cardio-polmonare, iniziando dalle compressioni toraciche (profonde circa 4 cm). (9) Dopo le 30 compressioni toraciche effettua le 2 ventilazioni bocca-bocca/naso, controllando prima nella bocca e, solo se il corpo estraneo è ben visibile, rimuovilo. (10) Dopo 2 minuti di rianimazione cardio-polmonare (RCP) se qualcuno non lo ha già fatto allerta personalmente il 118. Riprendi la rianimazione cardio polmonare (RCP) fino all'arrivo del soccorso medico d'emergenza 118 (punti 8 e 9).

Se vuoi imparare le manovre di disostruzione o diventare nostro Istruttore contattaci:

salvamentobrescia.it